

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre spécialiste dentaire ou à votre pharmacien.

DYNEXAN® 2% crème buccale

Dans cette notice, vous trouverez les informations suivantes:

- 1. Qu'est-ce que DYNEXAN® 2%, crème buccale et dans quel cas est-il utilisé ?**
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale ?**
- 3. Comment utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale ?**
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?**
- 5. Comment conserver DYNEXAN® 2%, crème buccale ?**
- 6. Informations supplémentaires**

1. Qu'est-ce que DYNEXAN® 2%, crème buccale et dans quel cas est-il utilisé ?

Il s'agit d'un traitement symptomatique de courte durée des lésions douloureuses de la cavité buccale.

Il permet l'anesthésie locale de contact avant explorations instrumentales en odontostomatologie.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale ?

N'utilisez jamais DYNEXAN® 2%, crème buccale:
En cas d'intolérance à l'un des composants de la crème buccale, en particulier à la lidocaïne ou aux anesthésiques locaux en général. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre spécialiste dentaire ou de votre pharmacien.

Faites attention avec DYNEXAN® 2%, crème buccale

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans. Respecter les conseils d'administration et de posologie.

Ne pas avaler après application sur la muqueuse. En raison de l'anesthésique local, tenir compte d'un risque de morsures (lèvres, joues, langue).

Consultez votre médecin ou votre spécialiste dentaire en cas d'aggravation des symptômes ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre spécialiste dentaire ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

En principe, les interactions connues de la lidocaïne avec certains médicaments de cardiologie (anti-arythmiques, bêta-bloquants) ne concernent pas la lidocaïne administrée par voie locale sur la muqueuse de la cavité buccale.

Cependant, il faut tenir compte d'un éventuel passage de la lidocaïne dans la circulation générale en cas de muqueuse buccale lésée. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre spécialiste dentaire ou à votre pharmacien.

Grossesse

Il est préférable d'éviter d'utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale pendant la grossesse.

Cependant, au cours de la grossesse, il peut apparaître une gingivite ou une maladie parodontale (de l'os de la gencive) importante, pour laquelle la seule hygiène buccale n'est pas suffisante. Dans ce cas, DYNEXAN® 2%, crème buccale peut être utilisée, mais uniquement sur une courte période.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre spécialiste dentaire ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de DYNEXAN® 2%, crème buccale est possible au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre spécialiste dentaire ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Pas de données particulières.

Liste des excipients à effet notoire

Dérivés terpéniques.

3. Comment utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale ?

Un avis médical doit être demandé avant l'application de ce médicament.

Adulte

Application de 0,5 g de crème, quatre fois par jour maximum soit 40 mg de lidocaïne.

Enfant de 6 à 15 ans

Application de 0,5 g de crème, quatre fois par jour maximum soit 40 mg de lidocaïne.

Usage local strict.

Application gingivale et buccale.

Masser doucement pour bien répartir la crème sur la zone à traiter.

Ne pas dépasser la dose maximale de 200 mg de lidocaïne par jour.

L'indication ne justifie pas un traitement prolongé.

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre spécialiste dentaire.

**Si vous avez utilisé plus de DYNEXAN® 2%,
crème buccale que vous n'auriez dû :**

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette crème de lidocaïne en odontostomatologie.

Cependant, ce médicament contient des dérivés terpéniques dans les excipients pouvant entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions. Aussi il est nécessaire de prévenir votre spécialiste dentaire et de demander conseil à votre médecin en cas d'épilepsie ancienne ou récente.

En cas de surdosage ou de mauvaise utilisation en art dentaire : consulter immédiatement votre spécialiste dentaire, votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DYNEXAN® 2%,
crème buccale :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre et reprenez le cours normal de votre traitement. Vous pouvez prendre conseil auprès du prescripteur de votre traitement par DYNEXAN® 2%, crème buccale.

**4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

En cas d'intolérance à l'un des composants de la crème, des réactions allergiques sont possibles. Ces réactions apparaissent toutefois très rarement.

En cas de surdosage ou de passage dans la circulation générale, des réactions suivantes peuvent apparaître :

- système nerveux central : nervosité, agitation, tremblements, nystagmus, céphalées, nausées ;
- système respiratoire : tachypnée puis bradypnée, pouvant conduire à l'apnée ;
- système cardio-vasculaire : baisse du débit cardiaque et chute de la tension artérielle.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.anism.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver DYNEXAN® 2%,
crème buccale ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser DYNEXAN® 2%, crème buccale après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas +25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient DYNEXAN® 2%, crème buccale ?

La substance active est :

Le chlorhydrate de lidocaïne

Les autres composants sont :

Chlorure de benzalkonium, glycérol, eau purifiée, dioxyde de titane, paraffine liquide, silice colloïdale anhydre, thymol, saccharine sodique, galactomannane du guar, mélange d'huiles essentielles (huile essentielle de fruit de fenouil amer, huile essentielle de badiane, huile essentielle de mentha arvensis partiellement démentholée, huile essentielle de menthe poivrée), vaseline blanche.

**Qu'est ce que DYNEXAN® 2%, crème buccale
et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de crème buccale. Tube de 10 g.

**Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le
Marché et Fabricant**

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87-93

65203 Wiesbaden

ALLEMAGNE

Exploitant

Laboratoire Kreussler Pharma

18 avenue Parmentier

75011 Paris

**La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est le 15 Mai 2009**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de L'ANSM (France).

kreussler
PHARMA

**Chemische Fabrik
Kreussler & Co. GmbH
65203 Wiesbaden
Allemagne**



**TRIEZ VOS
EMBALLAGES**



étui carton et tube métal vides



bouchon
plastique
à jeter