

# DYNEXANgival® 1%

Crème buccale

Pour **anesthésier**  
localement la douleur  
buccale ou gingivale  
**RAPIDEMENT\*** et  
**DURABLEMENT\*\***

ADULTE ET ENFANT DE PLUS DE 6 ANS



\* Rapidement : en 1 minute

\*\* Durablement : pendant 1 heure  
Cf. mentions légales

**LA DOULEUR BUCCALE OU GINGIVALE  
N'EST PAS UNE FATALITÉ...**

**DYNEXANgival® 1%**  
Crème buccale

Chlorhydrate de lidocaïne

# DOULEURS DE LA MUQUEUSE BUCCALE

La muqueuse buccale peut être le siège de petites lésions traumatiques suite à une morsure, une blessure ou une brûlure.

Elles peuvent être également provoquées par une dent abîmée, une prothèse dentaire qui n'est plus adaptée ou en cours d'adaptation, un appareil d'orthodontie de l'enfant (généralement à partir de 11 ans) et de l'adulte.

Les aphtes représentent également des lésions de la muqueuse buccale.

**Ces lésions sont souvent accompagnées de douleurs vives.**

## LES APHTES :

L'aphte buccal est une pathologie fréquente, le plus souvent bénigne, mais gênante et très douloureuse.

Sous sa forme la plus fréquente, il est isolé : il s'agit alors d'une lésion unique, inférieure à 1 cm, arrondie, à bords réguliers, de couleur grisâtre ou jaunâtre entouré d'un liseré rouge.

Fréquemment précédé par des picotements - 48 heures avant - l'aphte apparaît généralement au niveau de la lèvre inférieure, des joues ou de la pointe de la langue, voire des gencives ou du palais.

Cicatrisation et guérison sont obtenues en quelques jours. Dans le cas contraire, consultez votre médecin.

Les facteurs connus favorisant leur apparition sont le stress, certains aliments (noix, gruyère,... ou fruits mal lavés).

Le traitement de la forme commune repose sur l'élimination du facteur déclenchant, une bonne hygiène buccale et le brossage régulier des dents sont recommandés, la prise en charge de la douleur.

**Masser la muqueuse douloureuse avec 0,2 g (1 petit pois) de DYNEXANGIVAL® 1% permet de prendre en charge cette douleur rapidement et durablement (environ 1 heure).**

**Chez l'adulte :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 6 applications par jour.**

**Chez l'enfant de 6 à 15 ans :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 applications par jour.**

**Durée maximale de traitement : 5 jours.**

## LÉSIONS TRAUMATIQUES PROVOQUÉES PAR UNE DENT, UN APPAREIL DENTAIRE, UN APPAREIL D'ORTHODONTIE :

Des lésions traumatiques peuvent être engendrées :

- Par une dent délabrée ou une couronne défectueuse, dont le bord tranchant agresse la muqueuse au niveau de la langue ou de la joue,
- Le bord ou le crochet d'un appareil dentaire (prothèse amovible <sup>(2)</sup> - dentier <sup>(3)</sup>) ou appareil d'orthodontie.

La taille de la lésion est alors variable, avec des bords réguliers et un léger gonflement, sans liseré rouge autour.

La restauration de la prothèse ou de la dent responsable et une bonne hygiène buccale permettent la guérison spontanée de la blessure de la muqueuse. La prise en charge de la douleur peut être nécessaire pour permettre de s'alimenter normalement, surtout chez les personnes âgées.

Toute lésion présumée traumatique persistant 5 jours après la suppression de l'agent traumatisant sans amélioration clinique nécessite de manière impérative une consultation pour en contrôler l'origine.

**Masser la muqueuse douloureuse avec 0,2 g (1 petit pois) de DYNEXANGIVAL® 1% permet de prendre en charge cette douleur rapidement et durablement (environ 1 heure).**

**Chez l'adulte :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 6 applications par jour.**

**Chez l'enfant de 6 à 15 ans :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 applications par jour.**

**Durée maximale de traitement : 5 jours.**

## MORSURE OU BRÛLURE DE LA MUQUEUSE :

Des lésions traumatiques peuvent être engendrées par une morsure, une brûlure.

La lésion est alors semblable à celle décrite dans le paragraphe précédent.

L'élimination ou la neutralisation de la cause et une bonne hygiène buccale permettent la guérison spontanée de la blessure de la muqueuse.

Pendant la guérison, la prise en charge de la douleur peut être nécessaire pour permettre de s'alimenter normalement, surtout chez les personnes âgées.

Toute lésion présumée traumatique persistant 5 jours après la suppression de l'agent traumatisant sans amélioration clinique nécessite de manière impérative une consultation pour en contrôler l'origine.

**Masser la muqueuse douloureuse avec 0,2 g (1 petit pois) de DYNEXANGIVAL® 1% permet de prendre en charge cette douleur rapidement et durablement (environ 1 heure).**

**Chez l'adulte :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 6 applications par jour.**

**Chez l'enfant de 6 à 15 ans :**

**1 application <sup>(1)</sup> à renouveler si nécessaire sans dépasser 3 applications par jour.**

**Durée maximale de traitement : 5 jours.**

(1) Appliquer 0,2 g de crème (1 petit pois) sur le doigt propre et masser le point douloureux pour bien répartir la crème sur la zone à traiter. Se laver soigneusement les mains après application de la crème.

(2) Une prothèse amovible demande généralement quelques jours d'adaptation. Bien réalisée, elle doit être bien supportée.

(3) Penser à nettoyer votre appareil dentaire.

# DOULEURS BUCCALES ET GINGIVALES

## DYNEXANgival® 1%

Crème buccale



### Ce qu'il faut retenir

- La seule crème buccale purement anesthésique disponible sans prescription.
- La rapidité et la puissance anesthésique de la lidocaïne.
- La forme crème permet l'application précise de **DYNEXANgival® 1%** au point douloureux.
- Pour les douleurs dues à des lésions bénignes des muqueuses buccales et gingivales : aphtes, blessures traumatiques et prothétiques, irritation des gencives.

#### Principe actif :

Chlorhydrate de lidocaïne 10,00 mg pour 1 g de crème.

#### Action pharmacologique :

Le Chlorhydrate de lidocaïne bloque l'influx nerveux par fixation sur un récepteur spécifique du canal sodique dans la membrane entourant la fibre nerveuse.

Il procure un soulagement de la douleur rapide - en 1 minute - et durable - environ 1 heure.

#### Forme pharmaceutique :

Crème buccale blanche : vaseline et paraffine prolongent l'action du principe actif en retardant son absorption par la muqueuse. Le glycérol, par ses propriétés émoullientes et adhérentes, facilite et limite la diffusion du principe actif au site d'application.

Medicament destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans, dans le traitement des douleurs dues à des lésions bénignes des muqueuses buccales et gingivales: aphtes, blessures traumatiques et prothétiques, irritation des gencives.

Demandez conseil à votre pharmacien. Lisez attentivement la notice avant utilisation.

Si les symptômes persistent après 5 jours de traitement, consultez votre médecin ou votre dentiste.

#### Posologie et mode d'administration :

**Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.**

Usage local strict. Application buccale et gingivale.

#### En pratique :

##### 3 gestes suffisent

- 1) **PRÉLEVER** l'équivalent d'un petit pois sur le doigt propre
- 2) **ETALER** légèrement entre le pouce et l'index
- 3) **MASSER** doucement la zone douloureuse pendant une minute

**Se laver soigneusement les mains après application de la crème.  
L'application peut être renouvelée 4 à 6 fois par jour chez l'adulte,  
ou 2 à 3 fois par jour chez l'enfant.**

Laboratoire Kreussler Pharma  
18 av. Parmentier, 75011 Paris  
Tel : 01 58 39 35 80 / Fax : 01 43 70 21 06  
Site : [www.kreussler.fr](http://www.kreussler.fr)

 **0 825 88 78 85**

(0,150€ / min)

**kreussler**  
PHARMA